



Troubles associés



Qui ?

Le trouble déficitaire de l'attention coexiste souvent avec d'autres troubles, notamment le **trouble des conduites (TC)** et le **trouble de l'opposition avec provocation (TOP)**.
Les études montrent que 30 à 50% des enfants présentant un TDA/H présentent également un TOP ou un TC associé.



Prise en charge

La prise en charge du TOP ou du TC repose sur une **prise en charge globale** de ces troubles associés au TDA/H.

La prise en charge repose sur la **psychoéducation** de l'enfant ou de l'adolescent et de sa famille, **les thérapies comportementales**, l'entraînement aux **compétences psychosociales** et, si besoin, une **prise en charge médicamenteuse**, souvent proposée en dernier recours.

Symptômes

Le **trouble oppositionnel avec provocation** et le **trouble des conduites** sont répertoriés dans le DSM-V. La symptomatologie associée est la suivante :

- Impulsivité et réactions excessives à la colère et à la frustration,
- Provocation à l'égard de l'autorité,
- Volonté d'embêter ou de blâmer les autres à sa place,
- Méchant, vindicatif, rancunier,
- Comportements violents à l'égard des autres,
- Faible empathie à l'égard des autres, manque de sensibilité et de considération à l'égard du bien-être des autres

